

TABELLE

PAGINA BIANCA

Tab.1a - PERSONE DI 14 ANNI E PIU' PER CONSUMO DI VINO, BIRRA, LIQUORI ED ALCOLICI FUORI PASTO ALMENO QUALCHE VOLTA L'ANNO ANNI 2001-2003 (Per 100 persone della stessa età)

ANNI	Consuma vino	Consuma birra	Consuma liquori	Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno	Consuma alcolici fuori pasto
2001	59,6	48,4	26,1	5,3	25
2002	57,4	46,3	24,1	5,3	23,2
2003	55,9	47,2	25,8	4,5	25,8

Tab.1b - PERSONE DI 14 ANNI E PIU' PER CONSUMO DI VINO, BIRRA, ALCOLICI FUORI PASTO ALMENO QUALCHE VOLTA L'ANNO ANNI 1993-2003 (a) (per 100 persone di 14 anni e più)

ANNI	Vino	Birra	Alcolici fuori pasto
1993	58,0	42,6	20,9
1994	57,1	44,5	22,4
1995	57,1	45,2	22,3
1997	58,8	46,8	24,3
1998	56,9	47,2	24,7
1999	56,8	46,7	23,5
2000	57,1	47,5	23,3
2001	59,6	48,4	25,0
2002	57,4	46,3	23,2
2003	55,9	47,2	25,8

(a) nel 1996 le informazioni non sono state rilevate

Tab.1c - PREVALENZA DEI CONSUMATORI (%) DI ALCOLICI FUORI PASTO NELLA CLASSE DI ETA' 14-17 ANNI - ANNI 1993-2003 (a)

	1993	1994	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Maschi	9,8	13,4	12,9	18,4	15,2	18,0	16,8	17,1	18,3	20,7
Femmine	7,1	8,0	6,0	10,8	9,7	12,8	12,2	13,8	11,5	16,2

(a) nel 1996 le informazioni non sono state rilevate

Tab.1d - PERSONE DI 14 ANNI E PIU' PER CONSUMO DI OLTRE 1/2 LITRO DI VINO AL GIORNO PER SESSO (per 100 persone) - ANNI 1993-2003

	1993	1994	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Maschi	14,0	12,1	12,2	10,7	9,7	9,3	9,8	9,3	9,0	8,1
Femmine	2,2	1,9	1,8	1,9	1,5	1,5	2,0	1,5	1,8	1,1

(a) nel 1996 le informazioni non sono state rilevate

Fonte: ISTAT 2005-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"-Anno 2003

**Tab. 1e - PERSONE DI 14 ANNI E PIU' PER CONSUMO DI VINO, BIRRA E LIQUORI ALMENO QUALCHE VOLTA L'ANNO PER REGIONE
ANNI 2001-2003 (per 100 persone della stessa regione)**

	Consuma vino		Consuma birra		Consuma liquori		Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno			Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno			Consuma alcolici fuori pasto		
	PIEMONTE	LIGURIA	VAL D'AOSTA	PIEMONTE	LIGURIA	VAL D'AOSTA	PIEMONTE	LIGURIA	VAL D'AOSTA	PIEMONTE	LIGURIA	VAL D'AOSTA	PIEMONTE	LIGURIA	VAL D'AOSTA
REGIONI	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Piemonte	64,0	60,0	58,5	48,2	44,5	45,9	26,7	23,9	25,4	6,0	5,4	5,5	29,8	28,5	26,1
Valle d'Aosta	66,0	62,9	59,9	49,3	50,2	46,2	35,4	31,8	30,0	8,3	7,6	5,1	30,0	28,4	26,0
Lombardia	60,8	58,8	56,9	46,9	42,9	46,1	30,7	26,0	29,8	5,1	5,6	4,7	26,4	27,2	24,5
Trentino Alto Adige	54,7	59,4	57,2	47,9	50,3	52,5	30,9	35,4	35,2	3,4	3,5	3,9	23,0	21,9	20,1
Bolzano	56,4	64,9	59,2	48,8	54,5	54,0	33,6	39,6	38,5	2,2	2,1	3,1	20,6	21,9	17,1
Trento	53,1	54,2	55,4	47,0	46,4	51,1	28,3	31,4	32,1	4,4	4,8	4,8	25,3	21,9	23,0
Veneto	63,6	63,9	63,7	48,1	49,8	50,2	32,2	29,7	32,1	5,6	5,4	5,3	28,2	29,5	26,7
Friuli Venezia Giulia	60,9	59,2	59,0	54,9	51,7	55,3	33,0	29,4	30,1	4,3	3,9	4,5	26,0	26,2	27,4
Liguria	65,8	62,0	61,3	45,7	44,6	46,0	24,7	26,8	24,9	5,8	6,3	5,6	31,7	30,6	27,4
Emilia Romagna	67,6	64,2	65,0	47,7	45,1	47,4	27,4	26,0	31,2	6,6	7,0	6,2	30,7	29,0	28,3
Toscana	63,8	65,0	62,9	44,4	46,6	46,9	23,1	25,0	24,8	7,5	7,9	6,3	31,2	31,3	31,8
Umbria	61,4	61,2	58,4	42,4	42,6	43,4	26,3	26,8	25,8	8,5	7,5	4,5	30,1	28,0	29,5
Marche	66,4	66,3	62,6	49,1	48,1	47,4	25,3	26,8	26,9	8,0	7,4	5,9	31,7	31,1	31,3
Lazio	57,7	54,2	53,3	51,7	46,0	45,9	29,1	28,1	29,7	4,1	4,1	4,4	26,1	26,4	22,6
Abruzzo	58,7	55,2	56,8	48,5	48,8	47,9	24,0	20,4	21,9	6,5	4,9	4,6	28,0	26,4	26,3
Molise	58,2	53,6	53,5	52,4	45,7	45,3	19,4	22,1	23,1	7,5	6,6	6,8	27,0	25,7	27,1
Campania	55,0	51,8	48,2	49,8	46,1	44,2	21,4	16,7	18,7	4,9	4,9	3,2	25,6	24,0	20,5
Puglia	56,8	56,5	52,5	50,5	50,6	49,2	21,0	21,4	20,8	5,3	5,7	3,4	28,7	28,8	26,6
Basilicata	54,4	54,0	53,4	41,6	44,4	47,4	21,7	17,3	22,4	8,9	4,6	6,7	27,8	27,3	26,3
Calabria	57,6	53,1	52,2	55,5	52,1	53,8	23,0	19,9	20,1	4,2	3,3	2,9	24,4	22,6	22,3
Sicilia	48,6	45,5	44,4	45,1	44,6	46,2	18,9	18,4	19,2	2,4	3,0	1,8	19,1	16,4	16,7
Sardegna	55,4	49,2	49,0	51,5	45,3	47,3	25,5	22,1	21,0	5,1	4,4	3,3	22,9	20,2	20,7
Italia	59,6	57,4	55,9	48,4	46,3	47,2	26,1	24,1	25,8	5,3	5,3	4,5	27,0	26,4	24,7

Fonte: ISTAT - Indagine Multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana-Anni 2001-2002-2003

**Tab.1f - PERSONE DI 14 ANNI E PIU' PER CONSUMO DI VINO, BIRRA, LIQUORI, ALCOLICI FUORI PASTO ALMENO QUALCHE VOLTA L'ANNO PER CLASSE DI ETA' E PER SESSO
(per 100 persone dello stesso sesso e classe di età) - ANNI 2001-2003**

CLASSI DI ETA'	Consumo vino			Consumo birra			Consumo liquori			Consumo oltre 1/litro di vino al giorno		Consumo alcolici fuori pasto			
	Consumo vino	Consumo birra	Consumo liquori	Consumo oltre 1/litro di vino al giorno	Consumo alcolici fuori pasto										
14-17	23,3	22,7	20,6	40,1	37,9	37,0	13,1	12,6	15,4	0,3	(..)	0,1	17,1	18,3	20,7
18-19	46,4	42,4	43,3	69,9	67,6	66,0	39,8	30,5	41,6	1,3	1,4	0,6	43,4	37,5	44,3
20-24	58,0	50,7	51,0	76,6	74,7	71,7	45,1	41,6	45,5	2,1	1,7	2,0	47,3	43,3	47,1
25-34	70,0	68,0	66,4	76,7	76,1	75,9	50,5	46,4	46,7	4,4	3,6	3,3	46,8	43,9	46,8
35-44	79,1	75,9	76,4	76,6	73,4	75,8	47,5	44,4	45,1	7,6	7,2	6,3	40,6	37,0	41,6
45-54	83,3	81,3	82,8	70,3	69,8	72,4	45,8	44,4	46,5	12,7	12,1	11,2	39,0	36,4	40,1
55-59	83,2	83,8	82,8	59,6	58,5	64,6	44,8	38,3	42,7	14,3	15,1	13,5	38,3	36,2	38,1
60-64	82,7	84,3	82,3	53,3	54,1	56,1	36,3	34,7	35,9	17,6	16,7	16,7	37,0	34,0	35,2
65-74	83,4	81,9	79,9	42,3	40,3	45,3	25,2	24,0	26,2	16,3	15,8	13,8	28,8	26,9	29,7
75 e più	77,4	75,0	76,3	28,1	25,3	29,7	13,7	14,0	15,5	12,1	12,9	10,5	21,6	20,9	19,6
Totale	73,8	71,6	71,2	69,7	62,0	63,9	39,9	37,0	38,9	9,3	9,0	8,1	37,8	35,1	38,0
14-17	15,6	11,9	12,6	57,3	22,4	22,4	8,2	7,4	10,1	0,2	(..)	(..)	13,8	11,5	16,2
18-19	25,7	23,1	19,9	42,6	39,7	34,6	22,2	20,0	22,2	0,2	(..)	0,2	27,5	26,3	28,5
20-24	34,9	29,4	30,5	43,8	41,9	40,4	21,1	20,5	22,1	0,4	(..)	0,3	24,4	26,6	30,0
25-34	41,8	40,7	37,4	47,9	45,1	42,2	16,9	17,5	19,7	0,7	1,2	0,4	18,7	18,5	22,9
35-44	49,9	47,1	43,9	46,9	43,4	44,4	16,7	14,6	16,3	1,2	1,4	0,8	13,8	12,3	14,9
45-54	55,8	53,4	49,0	40,3	38,0	37,9	16,3	13,8	15,2	1,9	2,9	1,4	13,4	12,1	13,5
55-59	54,5	53,1	52,1	30,6	28,9	29,4	13,5	11,3	14,1	2,8	3,1	2,0	11,1	9,3	10,8
60-64	53,7	50,6	48,4	24,3	22,3	25,2	10,8	9,3	9,9	3,3	2,7	1,8	8,9	7,5	8,5
65-74	48,8	49,7	46,4	14,3	14,0	16,6	4,9	5,4	5,8	2,2	2,7	2,3	6,1	5,3	6,6
75 e più	46,1	42,1	40,6	9,7	7,5	7,6	3,4	3,1	3,0	1,7	1,5	1,2	4,8	3,2	3,7
Totale	46,4	44,1	41,6	34,1	31,7	31,7	13,2	12,1	13,5	1,5	1,8	1,1	13,1	12,1	14,3
14-17	19,5	17,6	16,8	33,9	30,5	30,2	10,7	10,2	12,9	0,3	(..)	0,1	15,5	15,1	18,6
18-19	36,2	32,7	31,7	56,4	53,6	50,5	31,1	25,2	32,0	0,8	0,8	0,4	35,5	31,9	36,5
20-24	46,5	40,1	40,6	60,4	58,3	55,8	33,2	31,1	33,6	1,2	1,0	1,1	36,0	35,0	38,4
25-34	56,0	54,5	52,1	62,4	60,8	59,2	33,8	32,1	33,3	2,6	2,4	1,8	32,9	31,3	35,0
35-44	64,6	61,6	60,3	61,9	58,5	60,2	32,3	29,6	30,8	4,5	4,3	3,6	27,3	24,7	28,3
45-54	69,4	67,1	65,6	55,0	53,6	54,9	30,8	28,8	30,6	7,2	7,4	6,2	26,0	24,0	26,6
55-59	68,9	67,9	67,1	45,1	43,2	46,7	29,2	24,3	28,1	8,5	8,9	7,6	24,7	22,3	24,2
60-64	67,7	67,5	65,1	38,3	38,3	40,4	23,1	22,1	22,7	10,2	9,7	9,1	22,5	20,9	21,6
65-74	64,3	64,1	61,5	26,9	25,8	29,5	14,0	13,8	15,0	8,5	8,6	7,5	16,3	15,0	16,9
75 e più	57,6	54,2	53,8	16,5	14,0	15,7	7,2	7,1	7,6	5,5	5,7	4,7	11,0	9,7	9,5
Totale	59,6	57,4	55,9	48,4	46,3	47,2	26,1	24,1	25,8	5,3	5,3	4,5	25,0	23,2	25,8

Fonte: ISTAT -Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"-Anno 2001, 2002, 2003

**Tab.2a - USO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI STUDENTI TRA I 15
E I 19 ANNI ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA
ANNI 1999-2003 (%)**

	1999	2000	2001	2002	2003
Bevande alcoliche	86,5	89,4	87,4	89,0	90,8
Ubriacarsi	52,7	55,0	55,2	54,6	56,4

**Tab.2b - APPROVAZIONE E PERCEZIONE DEL RISCHIO NELL'USO DI BEVANDE
ALCOLICHE NEGLI STUDENTI TRA I 15 E I 19 ANNI (%)
ANNI 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Non disapprovo bere 1 o 2 bicchieri	75,0	74,0	79,0	76,0	77,0
Non disapprovo ubriacarsi 1 volta la settimana	18,0	20,0	23,0	25,0	26,5
Nessun rischio nel bere 4 o 5 bicchieri quasi ogni giorno	3,0	3,0	4,0	4,0	2,3

Fonte: Progetto ESPAD 2005

Tab.2c - DISTRIBUZIONE PER ETA' (%) DEGLI UTENTI DEI SERVIZI O GRUPPI DI LAVORO RILEVATI

CLASSI DI ETA'	MINISTERO DELLA SANITÀ												MINISTERO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO														
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<20	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	0,4	0,6	0,7	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	
20-29	8,6	9,4	9,0	9,6	9,5	9,2	10,1	10,3	10,7	6,0	6,7	6,1	7,1	6,0	6,1	6,0	6,5	7,9	8,8	8,3	9,1	8,7	8,5	9,1	9,3	9,8	
30-39	22,1	24,6	22,6	23,6	24,4	24,1	25,2	24,8	24,8	23,8	24,0	22,8	23,0	22,7	22,4	23,2	20,4	21,2	22,5	24,4	22,6	23,4	24,0	23,7	24,8	23,7	24,0
40-49	29,6	28,5	27,9	26,9	26,4	27,3	27,4	28,5	28,1	31,3	31,9	29,8	29,0	30,9	31,0	31,3	29,4	32,6	30,0	29,3	28,4	27,4	27,5	28,2	28,3	28,8	29,1
50-59	25,2	23,2	24,3	24,7	24,3	23,1	23,2	22,9	21,8	25,6	24,2	25,5	25,6	25,6	24,3	25,6	26,9	23,8	25,3	23,4	24,6	24,9	24,6	23,4	23,7	23,9	22,3
>=60	14,1	13,7	15,5	14,5	14,8	15,6	13,6	12,9	13,9	12,9	12,5	15,4	14,7	14,1	15,5	13,5	16,8	15,2	13,8	13,4	15,5	14,6	14,6	15,6	13,6	13,9	14,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

Fonte: Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VII

**Tab.3a - MORTALITA' PER "ACCIDENTE STRADALE DA VEICOLO A MOTORE"
ANNI 2000-2002 (valori assoluti e % sul totale dei decessi)**

CLASSI DI ETA'	valori assoluti	%	valori assoluti	%
Fino a 14 anni	157	4,4	161	4,6
15-24 anni	1.535	44,1	1.421	46,2
25-44 anni	2.323	14,6	2.436	16,0
45-54 anni	744	3,5	752	3,8
55-64 anni	696	1,4	612	1,3
65 anni ed oltre	1.807	0,4	1.693	0,4
Totali	7.262	1,3	7.075	1,3

Fonte: Elaborazione CENSIS su dati ISTAT "Cause di morte"- Anni 2000-2002

**Tab.3b - CAUSE DI INCIDENTE STRADALE IMPUTABILI A STATO PSICOFISICO
DERIVANTE DA EBBREZZA DA ALCOL SECONDO IL TIPO DI STRADA
ANNI 2003-2004**

	strade urbane	strade extraurbane	totale	% strade urbane sul totale strade	% su totale cause*
2003	2.614	934	3.548	73,7	1,2
2004	3.032	1.108	4.140	73	1,5

* Totale cause accertate o presunte di incidente stradale

Fonte: Elaborazione Min. Salute su ISTAT-ACI "Statistica degli incidenti stradali"- Anni 2003-2004

Tab. 4a - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER DIAGNOSI TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL (cod. ICD 9-CM 291, 303, 305.0, 357.5, 425.5, 535.3, 571.0, 571.1, 571.2, 571.3, 977.3, 980)
ANNO 2003
(Dimessi per 100.000 abitanti)

REGIONE DI DIMISSIONE	< 14 anni	15 - 35 anni	36 - 55 anni	> 55 anni	Totale				
Piemonte	1,1	1,2	82,9	30,6	369,8	129,3	431,1	93,5	168,2
Valle d'Aosta	0,0	0,0	197,4	77,5	836,1	294,3	1.524,6	264,7	459,8
Lombardia	3,7	2,0	141,9	40,3	399,8	132,7	621,7	115,0	204,6
Prov. Auton. Bolzano	19,6	5,1	360,3	126,8	910,7	279,1	1.184,1	295,2	420,9
Prov. Auton. Trento	5,3	2,8	132,1	44,6	637,3	162,3	1.363,4	219,5	349,0
Veneto	1,6	1,3	100,5	37,2	424,8	156,4	811,4	209,8	244,8
Friuli Venezia Giulia	0,0	1,5	60,5	9,7	451,6	154,4	847,4	217,6	264,0
Liguria	8,0	6,1	215,9	96,2	593,1	187,4	494,0	108,8	250,6
Emilia Romagna	0,4	3,4	126,6	49,1	356,0	138,8	442,1	86,2	176,9
Toscana	2,3	0,5	139,0	39,5	292,9	120,9	299,6	61,4	138,9
Umbria	13,2	8,0	104,2	29,7	206,4	73,5	376,9	54,5	125,0
Marche	2,0	0,0	164,0	52,5	472,3	161,1	427,4	81,7	194,7
Lazio	3,0	2,0	122,7	36,5	355,2	85,9	353,4	71,0	143,0
Abruzzo	4,4	5,8	228,8	64,8	628,7	142,0	674,3	109,6	259,6
Molise	4,3	9,1	193,0	50,3	780,8	126,9	710,5	103,8	274,7
Campania	2,6	1,2	69,8	16,2	235,9	48,1	228,5	55,0	82,7
Puglia	3,8	1,6	117,8	19,3	316,5	54,0	280,6	71,6	113,5
Basilicata	2,1	0,0	113,5	23,3	427,5	63,4	434,4	70,2	153,1
Calabria	6,6	0,0	96,9	16,9	371,7	75,9	474,2	69,5	144,8
Sicilia	4,2	1,0	79,7	16,0	280,0	38,3	190,0	37,5	84,5
Sardegna	7,8	4,6	141,3	27,2	515,3	89,0	553,4	91,7	195,2
Italia	3,5	1,9	118,3	33,6	378,0	108,1	469,5	97,7	167,9

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

**Tab.4b - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE DIAGNOSI TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL
(cod. ICD 9-CM 291, 303, 305.0, 357.5, 425.5, 535.3, 571.0, 571.1, 571.2, 571.3, 977.3, 980) SECONDO LA CLASSE DI ETA'
DEL DIMESSO - ANNO 2003**

CAUSE DI DIMISSIONE (*)	< = 14 anni	15 - 35 anni	36 - 55 anni	> 55 anni	Totale
291 Sindrome psicotiche indotte da alcool	0,1	12,7	49,2	38,0	100,0
303 Sindrome di dipendenza da alcool	0,1	18,5	53,2	28,2	100,0
305.0 Abuso di alcool	0,9	34,5	46,0	18,6	100,0
357.5 Polineuropatia alcoolica	0,0	4,3	44,5	51,2	100,0
425.5 Cardiomiopatia alcoolica	0,0	2,5	37,6	59,9	100,0
535.3 Gastrite alcoolica	0,4	8,8	34,1	56,7	100,0
571.0 Steatosi epatica alcoolica	0,1	8,0	39,7	52,3	100,0
571.1 Epatite acuta alcoolica	0,0	11,1	45,3	43,5	100,0
571.2 Cirrosi epatica alcoolica	0,0	1,6	30,6	67,8	100,0
571.3 Danno epatico da alcool, non specificato	0,0	7,4	42,4	50,1	100,0
977.3 Avvelenamento da antagonisti dell'alcool	0,0	21,4	42,9	35,7	100,0
980 Effetti tossici dell'alcool	16,6	32,6	30,3	20,5	100,0
Totale	0,2	12,2	42,7	44,9	100,0

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

**Tab.4c - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE DIAGNOSI TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL
SECONDO IL SESSO DEL DIMESSO - ANNO 2003**

CAUSE DI DIMISSIONE (*)	Valore assoluto			Valore percentuale		% diagnosi secondo il tipo di diagnosi
	M	F	T	M	F	
291 Sindrome psicotiche indotte da alcool	4.397	1.116	5.513	79,8%	20,2%	5,1%
303 Sindrome di dipendenza da alcool	26.392	7.571	33.963	77,7%	22,3%	31,4%
305.0 Abuso di alcool	7.686	2.729	10.415	73,8%	26,2%	9,6%
357.5 Polineuropatia alcoolica	2.124	500	2.624	80,9%	19,1%	2,4%
425.5 Cardiompatia alcoolica	559	85	644	86,8%	13,2%	0,6%
535.3 Gastrite alcoolica	633	269	902	70,2%	29,8%	0,8%
571.0 Steatosi epatica alcoolica	7.699	2.197	9.896	77,8%	22,2%	9,1%
571.1 Epatite acuta alcoolica	3.755	842	4.597	81,7%	18,3%	4,2%
571.2 Cirrosi epatica alcoolica	25.812	6.711	32.523	79,4%	20,6%	30,0%
571.3 Danno epatico da alcool, non specificato	5.654	1.212	6.866	82,3%	17,7%	6,3%
977.3 Avvelenamento da antagonisti dell'alcool	11	3	14	78,6%	21,4%	0,0%
980 Effetti tossici dell'alcool	241	96	337	71,5%	28,5%	0,3%
Totale	84.963	23.331	108.294	78,5%	21,5%	100,0%

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

**Tab. 4d - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI TASSI DI
OSPEDALIZZAZIONE PER DIAGNOSI TOTALMENTE
ATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL (cod. ICD 9-CM 291, 303, 305.0, 357.5,
425.5, 535.3, 571.0, 571.1, 571.2, 571.3, 977.3, 980)
ANNI 2000-2002-2003
(Dimessi per 100.000 abitanti)**

REGIONE DI DIMISSIONE	2000	2002	2003
Piemonte	174,2	178,6	168,2
Valle d'Aosta	398,0	560,5	459,8
Lombardia	215,8	220,1	204,6
Prov. Auton. Bolzano	448,0	426,6	420,9
Prov. Auton. Trento	421,1	357,6	349,0
Veneto	263,9	251,6	244,8
Friuli Venezia Giulia	300,0	283,7	264,0
Liguria	279,2	272,7	250,6
Emilia Romagna	180,2	184,5	176,9
Toscana	143,2	149,8	138,9
Umbria	153,7	119,1	125,0
Marche	200,9	203,6	194,7
Lazio	137,4	146,1	143,0
Abruzzo	243,2	259,4	259,6
Molise	234,2	286,8	274,7
Campania	80,3	93,5	82,7
Puglia	125,4	123,7	113,5
Basilicata	177,2	164,0	153,1
Calabria	145,3	149,8	144,8
Sicilia	72,5	85,7	84,5
Sardegna	161,1	205,2	195,2
Italia	172,2	177,1	167,9

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

**Tab.4e - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE DIAGNOSI
TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL**
*(cod. ICD 9-CM 291, 303, 305.0, 357.5, 425.5, 535.3, 571.0, 571.1, 571.2, 571.3,
977.3, 980) SECONDO LA CLASSE DI ETA' DEL DIMESSO
ANNI 2000-2001-2003*

CAUSE DI DIMISSIONE (*)	< = 14 anni	15 - 35 anni	36 - 55 anni	> 55 anni
2000	0,2	13,8	41,7	44,3
2002	0,3	12,8	42,9	44,1
2003	0,2	12,2	42,7	44,9

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie
Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

**Tab.4f - DISTRIBUZIONE DELLE DIAGNOSI TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOOL
ANNI 2000-2002-2003**

CAUSE DI DIMISSIONE (*)	% diagnosi secondo il tipo di diagnosi		
	Alcool	Alcol e altro	Alcol solo
291 Sindrome psicotiche indotte da alcool	5,4%	5,0%	5,1%
303 Sindrome di dipendenza da alcool	31,8%	32,2%	31,4%
305.0 Abuso di alcool	10,6%	9,1%	9,6%
357.5 Polineuropatia alcoolica	2,4%	2,6%	2,4%
425.5 Cardiompatia alcoolica	0,7%	0,7%	0,6%
535.3 Gastrite alcoolica	0,9%	0,8%	0,8%
571.0 Steatosi epatica alcoolica	9,4%	9,5%	9,1%
571.1 Epatite acuta alcoolica	5,5%	4,7%	4,2%
571.2 Cirrosi epatica alcoolica	26,3%	28,3%	30,0%
571.3 Danno epatico da alcool, non specificato	7,0%	6,7%	6,3%
977.3 Avvelenamento da antagonisti dell'alcool	0,0%	0,0%	0,0%
980 Effetti tossici dell'alcool	0,1%	0,4%	0,3%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

PARTE SECONDA

3. I servizi alcologici e l'utenza dopo l'emanazione della legge 30.3.2001 n. 125.

Anno 2004

3.1. Il personale dei servizi

Al 31.12.2004 sono stati rilevati 441¹ servizi o gruppi di lavoro per l'alcoldipendenza distribuiti in 18 regioni. Di questi servizi il 93,2% sono di tipo territoriale, il 4,1% di tipo ospedaliero, il 2,3% di tipo universitario e lo 0,4% di tipologia non nota (tab.1-2; graf.1). In totale nel 2004 sono state preposte alle attività relative all'alcoldipendenza 3.680 unità di personale: 808 addette esclusivamente (22,0% del totale) e 2.872 addette parzialmente (78,0% del totale) (tabella 3; graf.2).

Nella tabella 4 e nel grafico 3 sono riportate le distribuzioni percentuali, distintamente, dei ruoli professionali addetti esclusivamente ed addetti parzialmente sul personale complessivo (somma di esclusivi e parziali). Si osserva, limitando l'analisi ai profili direttamente coinvolti nel trattamento dell'alcoldipendenza, che la proporzione più alta di addetti esclusivi spetta agli educatori professionali (29,5%), seguiti dagli assistenti sociali (22,4%), dagli psicologi (21,3%) e dagli infermieri professionali (21,1%); viceversa, nel ruolo medico la quota più elevata è rappresentata dagli addetti parziali (79,6%).

I grafici 4-6 mostrano la composizione per tipologia di ruolo per il personale totale e per le due categorie in cui è stato ripartito. Analizzando il dato nazionale, si osservano percentuali più alte di medici, di psicologi e di infermieri professionali nel personale a tempo parziale (rispettivamente, 23,6%, 17,8%, 24,1% rispetto a 21,5%, 17,1%, 22,9% degli esclusivi) e, viceversa, maggiore peso di educatori e di assistenti sociali negli addetti esclusivi (rispettivamente, 11,8% e 16,2% rispetto a 7,9% e 15,8% dei parziali). Infine, il personale amministrativo e di altro tipo rappresenta circa il 10,5% sia nel personale parziale che in quello esclusivo.

La tabella 5 e i grafici 7-9 riportano i trend del numero assoluto di personale (totale, esclusivo e parziale) distinto nelle singole qualifiche professionali. Si osserva, per il personale esclusivo, una diminuzione (in termini assoluti) dal 2002 dei medici e degli psicologi e, dal 2003, degli assistenti sociali e degli infermieri, mentre aumentano gli educatori professionali; viceversa, negli addetti parziali, dal 2000 si ha una tendenza all'aumento per ogni figura professionale.

In termini percentuali (tab.6) si conferma la tendenza, osservata per la prima volta nel 2003, alla diminuzione, sia per il totale delle unità di personale impiegate che per i singoli ruoli professionali direttamente coinvolti nel trattamento dell'alcoldipendenza, della quota degli addetti esclusivi.

La tabella 7 mostra l'andamento temporale della composizione dell'organico complessivo distinto nei 4 ruoli professionali (medici, psicologi, operatori sociosanitari e personale

¹ Per la regione Basilicata sono state raccolte le informazioni previste dai modelli di rilevazione a livello regionale e non di singolo servizio. Pertanto non si ha l'informazione relativa al numero di servizi o gruppi di lavoro rilevati.

amministrativo e di altro tipo): si nota un valore sostanzialmente stabile dal 2001 della quota di psicologi (intorno al 17-18%) e una lieve flessione, nell'ultimo triennio, di medici nel personale totale ed esclusivo a cui corrisponde un aumento di operatori socio-sanitari.

3.2. I modelli organizzativi, gli approcci terapeutici e i programmi di trattamento

Nella tabella 8 sono visualizzate, per ogni singola funzione e con dettaglio regionale, le percentuali di servizi o gruppi di lavoro che hanno dichiarato di aver svolto nel corso del 2004 le funzioni indicate. Come si può osservare, oltre il 90% dei servizi ha svolto attività di accoglienza, osservazione e diagnosi (95,9%), ha definito (93,2%) e/o attuato (95,5%) programmi terapeutico-riabilitativi e ha effettuato interventi di prevenzione (88,7%). Per le funzioni di coordinamento, le percentuali di attivazione più basse sono riferite a quelle che coinvolgono le rilevazioni epidemiologiche (56,2%) e gli interventi di altre strutture o servizi sanitari pubblici (62,1%), le più alte sono attribuibili al coordinamento con il servizio sociale pubblico (88,7%), con i servizi ospedalieri (85,5%) e con il medico di famiglia (83,9%). I piani operativi di formazione del personale e sensibilizzazione hanno coinvolto il 72,6% dei servizi rilevati. Tali percentuali sono molto variabili regionalmente. Analizzando i programmi di trattamento (tab.9; graf.10) si osserva che il 28,9% degli utenti è stato sottoposto a trattamenti medico-farmacologici in regime ambulatoriale, il 25,4% al “counseling” rivolto all’utente o alla famiglia, il 10,2% è stato inserito in gruppi di auto/mutuo aiuto; per l’11,8% si è scelto un trattamento socio-riabilitativo, mentre l’inserimento in comunità di carattere residenziale o semiresidenziale ha riguardato solo il 2,3% degli alcoldipendenti. I trattamenti psicoterapeutici sono stati attivati per l’11,5% degli utenti e sono principalmente consistiti nella terapia individuale (59,1%) e nella terapia di gruppo o familiare (40,9%).

Il ricovero ha riguardato il 7,5% del totale degli utenti rilevati (5,7% in istituti pubblici, 1,8% in case di cura private convenzionate); in entrambi i casi la causa principale di ricovero è rappresentata dalla sindrome di dipendenza da alcol (70,2% sul totale dei ricoverati in regime ospedaliero ordinario o in day hospital e 72,2% sul totale dei ricoverati in casa di cura privata convenzionata)(graf.11).

Dall’analisi territoriale emerge nuovamente una situazione di estrema eterogeneità a livello regionale: ad esempio si ricorre al trattamento medico-farmacologico per il 44,1% dei casi in Emilia Romagna e solo nell’11,8% dei casi nel Friuli Venezia Giulia; per il counseling valori elevati si osservano nelle Province autonome di Bolzano e di Trento e in Abruzzo (rispettivamente 38,4%, 40,2% e 38,6%), mentre per la psicoterapia (individuale o di gruppo) nelle Marche (32,0%) e in Campania (21,6%); l’inserimento in gruppi di auto/mutuo aiuto presenta valori superiori alla media nazionale in diverse regioni del nord-centro mentre il trattamento socioribilitativo è relativamente più frequente in Valle D’Aosta (19,1%) e in Emilia Romagna (18,3%); l’inserimento in comunità semiresidenziali o residenziali è massimo in Valle d’Aosta (9,8%) e minimo in Abruzzo (0,7%). Infine, relativamente al ricorso al ricovero in strutture pubbliche, spiccano la Valle d’Aosta e il Lazio con il 10,8% e l’11,2% dei casi; analogamente, riguardo al ricovero in strutture private convenzionate, le Marche si contraddistinguono per un 10,7% di utenti che

vengono indirizzati a questo tipo di approccio terapeutico.

Nel periodo 1996-2004 (tab.10, graf.12) si delinea complessivamente una tendenziale crescita della percentuale di trattamenti medico-farmacologici ambulatoriali (da 20,6% a 28,9%) e una tendenziale diminuzione della frequenza di pazienti che partecipano a gruppi di auto/mutuo aiuto (da 21,1% a 10,2%); dal 2002 aumentano i soggetti sottoposti a counseling (da 23,0% a 25,4%) e diminuiscono quelli sottoposti a psicoterapia (da 12,5% a 11,5%); inoltre aumentano dal 2000 gli utenti inseriti in comunità di carattere residenziale o semiresidenziale (da 1,7% a 2,3%) e quelli che usufruiscono di un trattamento di tipo socioriusabilitativo (da 8,1% a 11,8%); infine il ricovero costituisce una possibilità di trattamento in tendenziale disuso (la proporzione di pazienti che vi ricorrono scende dal 10,3% del 1996 al 5,7% del 2004), soprattutto nelle strutture pubbliche.

3.3. La collaborazione dei servizi con gli Enti e le Associazioni del Volontariato, Privato sociale e Privato

Per quanto riguarda la collaborazione con i Gruppi di auto-mutuo aiuto, si osserva (tab.11a) che nel 2004 il 53,1% dei servizi ha collaborato con i CAT, il 34,0% con gli AA. e l'11,6% con altri gruppi. Le attività di collaborazione con le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali e con le cooperative sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi riguardano rispettivamente il 36,3% e il 15,2% dei servizi; la percentuale dei servizi impegnati, insieme alle cooperative sociali, nell'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio è pari al 35,6%. Nettamente inferiori sono le percentuali di collaborazione dei servizi o gruppi di lavoro rilevati con gli Enti privati (tab.11b), cioè con case di cura convenzionate (16,1%) o private (1,4%). Si ripropone, come per molti altri aspetti del fenomeno in esame, l'assenza di una omogeneità territoriale, qui ancora più accentuata per la presenza di situazioni "estreme" (regioni con scostamenti molto significativi, in una direzione o in quella opposta, rispetto al valore centrale di riferimento)

Nella tabella 12 è riportato il numero medio annuale, per servizio o gruppo di lavoro, di Enti o Associazioni del volontariato e privato sociale (tab.12a) e di Enti privati (tab.12b) che hanno collaborato con i servizi per l'alcoldipendenza. Analizzando il dato nazionale si osserva che mediamente, nel corso del 2004, ogni servizio ha collaborato con circa 8 CAT, 4 AA e 3 comunità e cooperative sociali. Meno frequente, come già visto, la collaborazione con gli Enti privati (valori medi pari a 1,8 e 2,5, rispettivamente, per la case di cura convenzionate e private), mentre permangono in entrambi i casi le differenziazioni a livello regionale.

3.4. Le caratteristiche demografiche dell'utenza

Nel 2004²² sono stati presi in carico presso i servizi o gruppi di lavoro rilevati 53.914

²² E' importante fin da subito premettere che le osservazioni seguenti, relative alle caratteristiche "demografiche" (sesto ed età) degli alcoldipendenti, riflettono presumibilmente le caratteristiche della popolazione generale da cui la sottopolazione in esame (utenti dei servizi per l'alcoldipendenza) proviene e